

Адисорд®, 100 мг, капсулы
Адисорд®, 200 мг, капсулы

Действующее вещество: нифуроксазид

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается в течение 3 дней приема препарата, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Адисорд® и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Адисорд®.
3. Прием препарата Адисорд®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Адисорд®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Адисорд®, и для чего его применяют

Препарат Адисорд® содержит действующее вещество нифуроксазид, которое относится к группе противомикробных средств, оказывает местное антибактериальное действие в отношении некоторых видов бактерий в просвете кишечника.

Показания к применению

Препарат Адисорд® применяется у взрослых и детей в возрасте старше 3 лет для лечения острой бактериальной диареи, протекающей без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации.

Способ действия препарата Адисорд®

После приема внутрь нифуроксазид практически не всасывается из пищеварительного тракта, и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника.

Не нарушает равновесие кишечной микрофлоры. При острой бактериальной диарее восстанавливает оптимальное соотношение микроорганизмов, составляющих нормальную кишечную флору. При инфицировании вирусами, способными поражать клетки слизистой оболочки кишечника, препятствует развитию бактериальной суперинфекции.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение в течение первых 3 дней приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Адисорд®

Противопоказания

Не принимайте или не давайте ребенку препарат Адисорд®:

- если у Вас или у Вашего ребенка аллергия на нифуроксазид, производные нитрофурана или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы беременны;
- если Ваш ребенок младше 3 лет (для данной лекарственной формы).

Сообщите лечащему врачу, если что-либо из этого относится к Вам.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Адисорд® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- Во время лечения диарей увеличьте потребление жидкости для восполнения ее потери (среднее суточное потребление воды для взрослого составляет 2 литра). В случае, если у Вас тяжелая и длительная диарея, сильная рвота или анорексия, обратитесь к врачу. Возможно Вам потребуется восполнение потери жидкости внутривенно.
- Сообщите врачу, если Вы почувствуете ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, симптомы интоксикации

или инфекции. Вам может потребоваться применение антибактериальных препаратов системного действия.

- В случае возникновения симптомов аллергии, таких как одышка, сыпь, кожный зуд, **немедленно прекратите прием препарата и обратитесь за медицинской помощью.**
- Если диарея сохраняется более 3 дней, несмотря на прием препарата Адисорд®, Вам следует обратиться к врачу.

Дети

Прием препарата Адисорд® капсулы противопоказан детям до 3 лет (для данной лекарственной формы).

Другие препараты и препарат Адисорд®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Адисорд® может повлиять на действие других препаратов или наоборот, может увеличить риск и степень серьезности нежелательных реакций.

Не принимайте препарат Адисорд® вместе с препаратами:

- вызывающими развитие дисульфирамоподобных реакций (боль в животе, тошнота, рвота, головная боль, учащенное сердцебиение (тахикардия), нечеткое зрение, слабость, судороги).
- угнетающими функцию центральной нервной системы.

Препарат Адисорд® с алкоголем

Употребление алкоголя во время приема препарата Адисорд® запрещается, поскольку может вызвать острые и тяжелые реакции непереносимости (так называемые дисульфирамоподобные реакции).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

Не принимайте препарат Адисорд®, если Вы беременны или предполагаете беременность. Женщинам детородного возраста препарат Адисорд® следует принимать только в том случае, если они используют эффективные методы контрацепции.

Грудное вскармливание

Во время периода лактации возможно продолжение грудного вскармливания в случае короткого курса лечения препаратом Адисорд®. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Адисорд® не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Адисорд® 200 мг содержит краситель солнечный закат желтый

В состав капсул 200 мг препарата Адисорд® входит краситель солнечный закат желтый, который может вызывать аллергические реакции.

3. Прием препарата Адисорд®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Капсулы 100 мг

200 мг (2 капсулы по 100 мг) 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 ч).

Капсулы 200 мг

200 мг (1 капсула по 200 мг) 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 ч).

Применение у детей и подростков

Детям в возрасте от 3 до 6 лет: 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 3 раза в сутки (интервал между приемами 8 ч).

Детям в возрасте от 6 до 18 лет: 200 мг (1 капсула по 200 мг или 2 капсулы по 100 мг) 3–4 раза в сутки (интервал между приемами 6–8 ч).

Путь и (или) способ введения

Препарат Адисорд® следует принимать внутрь. Капсулу проглотить целиком, запивая небольшим количеством воды.

Продолжительность терапии

Продолжительность курса лечения 5–7 дней, но не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней приема улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу.

Если Вы приняли препарата Адисорд® больше, чем следовало

Если Вы приняли препарат Адисорд® больше, чем указано в данном листке-вкладыше, незамедлительно проконсультируйтесь с лечащим врачом либо обратитесь в медицинское учреждение.

Симптомы передозировки неизвестны, Вам может потребоваться медицинская помощь. В случае передозировки лечение симптоматическое.

Если Вы забыли принять препарат Адисорд®

Если Вы забыли принять препарат, используйте следующую дозу в обычное время.

Не принимайте двойную дозу препарата Адисорд®, чтобы компенсировать пропущенную.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Адисорд® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

После приема препарата Адисорд® могут возникнуть серьезные аллергические реакции, такие как отек Квинке, анафилактический шок.

Сразу прекратите прием препарата и немедленно обратитесь за медицинской помощью при возникновении перечисленных ниже симптомов аллергической реакции:

- отек лица, губ, языка и/или горла, которые могут сопровождаться затруднением дыхания или глотания (признаки отека Квинке),
- резкое снижение артериального давления, затруднение дыхания, зуд кожи, отек кожи и/или слизистых, побледнение или покраснение кожных покровов, головокружение, обморочные состояния, тошнота и рвота (признаки анафилактического шока).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Адисорд®: кожная сыпь, крапивница.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://roszdravnadzor.gov.ru>

5. Хранение препарата Адисорд®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке после слов «Годен до: ». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С во вторичной упаковке (пачке картонной).

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребует. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Адисорд® содержит

Действующим веществом является нифуроксазид.

Адисорд®, 100 мг, капсулы

Каждая капсула содержит 100 мг нифуроксазида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал кукурузный прежелатинизированный, маннитол, магния стеарат, тальк.

Капсула твердая желатиновая № 2: титана диоксид, желатин, краситель железа оксид желтый.

Адисорд®, 200 мг, капсулы

Каждая капсула содержит 200 мг нифуроксазида.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал кукурузный прежелатинизированный, маннитол, магния стеарат, тальк.

Капсула твердая желатиновая № 0: титана диоксид, желатин, краситель хинолиновый желтый, краситель солнечный закат желтый.

Препарат Адисорд®, 200 мг, капсулы содержит краситель солнечный закат желтый

(см. раздел листка-вкладыша «О чем следует знать перед приемом препарата Адисорд®»).

Внешний вид препарата Адисорд® и содержимое упаковки Капсулы.

Адисорд®, 100 мг, капсулы

Твердые желатиновые капсулы № 2, корпус и крышечка темно-желтого цвета.

Содержимое капсул – смесь гранул и порошка желтого цвета. Допускаются включения спрессованной массы желтого цвета, рассыпающиеся при легком нажатии.

По 10 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 2 или 3 контурных ячейковых упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Адисорд®, 200 мг, капсулы

Твердые желатиновые капсулы № 0, корпус и крышечка желтого цвета.

Содержимое капсул – смесь гранул и порошка желтого цвета. Допускаются включения спрессованной массы желтого цвета, рассыпающиеся при легком нажатии.

По 8, 10 или 16 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 30 или 60 капсул в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена низкого давления или полиэтилентерефталата, укупленную крышкой из полиэтилена (25 % ПЭНД + 75 % ПЭВД или низкого давления) или полипропилена.

На банку наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

По 2 контурных ячейковых упаковки по 8 или 10 капсул или по 1 контурной ячейковой упаковке по 16 капсул, или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью «Кронофарм» (ООО «Кронофарм»)

109235, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, ул. 1-я Курьяновская, д. 34, стр. 1

Телефон: +7 (495) 136-26-40

Электронная почта: info@kronopharm.ru

Производитель

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105

Телефон: +7 (495) 797-99-54

Электронная почта: safety@canonpharma.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 105

Телефон: +7 (495) 797-99-54

Электронная почта: safety@canonpharma.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза: <http://eec.eaeunion.org>